



**INSTITUT
FÜR PLASTISCHE
& ÄSTHETISCHE
CHIRURGIE**

Übermäßiges Schwitzen

Allgemeines

Vermehrtes Schwitzen im Bereich der Achselhöhlen, dunkle Flecken auf Hemden und Anzügen und am Schluss weiße Ränder, diese Kombination ist für viele Menschen nicht nur nervig, sondern stellt ein echtes medizinisches und soziales Problem dar.

Wirkungsprinzip

Das Einspritzen von Botulinumtoxin A in die betreffenden Hautareale ist das Mittel der Wahl. Binnen weniger Tage blockiert Botox für durchschnittlich 6-9 Monate wirkungsvoll die Übertragung von Nervenimpulsen zu den kleinen Muskeln, die das Entleeren der Schweißdrüsen bewirken und übermäßiges Schwitzen (Hyperhidrosis) gänzlich unterbinden. Alternativ zur Botoxbehandlung können Langzeitergebnisse bei verstärkter Schweißbildung vor allem an den Achselhöhlen mit folgenden Operationen erzielt werden: Ausschaben (Kürettieren), Absaugen der Schweißdrüsen unter den Achseln (Schweißdrüsensuktion/Schweißdrüsenabsaugung), Herausschneiden der Schweißdrüsen (Exzision), selten Nervendurchtrennung (Sympathektomie).

Wie oft muss behandelt werden?

Dauer der Wirkung beträgt ca. 6-9 Monate. Die Behandlung kann jederzeit wiederholt werden, auch unter Umständen nur punktuell an Stellen, an denen die Schweißneigung wieder besonders stark auftritt.

Operationsvorbereitung

Ausführliche ärztliche Beratung und Risikoauflärung. Keine Voruntersuchungen bei Behandlung mit Botulinumtoxin. Bei Operationen: Ganzkörperuntersuchung, Blutabnahme, EKG

OP-Dauer: 20-40 Minuten

Narkose

Bei Operationen: örtliche Betäubung, Dämmerschlaf oder selten Narkose.

Klinikaufenthalt: Ambulant

Nachbehandlung

Bei Operation: Kompressionsverband für 1 Woche

Arbeitsunfähigkeit: 0-7 Tage

Dr. Christian Lenz
Facharzt für plastische
und ästhetische Chirurgie
Tel. +49 89 80038228
info@medicalinstitut.de
www.medical-institut.de

Praxisadresse
Dr. Christian Lenz
Franz-Joseph-Str. 9
80801 München

Klinikadresse
Klinik MedNord
Heidemannstr. 5b
80939 München



**INSTITUT
FÜR PLASTISCHE
& ÄSTHETISCHE
CHIRURGIE**

Gesellschaftsfähigkeit

Bei Botulinumtoxin: sofort, bei Operationen: nach 1-2 Tagen

Sport

Bei Operation: ohne Einschränkung nach 6 Wochen

Sonne und Solarium

Bei Operation: nach 6 Wochen

Sauna

Bei Operation: nach 6 Wochen

Nachuntersuchungen

Bei Operation nach 2, 8 und 12 Wochen

Mögliche Risiken

Bluterguss, unschöne Narbenbildung, Wundheilungsstörung im Achselbereich, Restschwitzen

Dr. Christian Lenz
Facharzt für plastische
und ästhetische Chirurgie
Tel. +49 89 80038228
info@medicalinstitut.de
www.medical-institut.de

Praxisadresse
Dr. Christian Lenz
Franz-Joseph-Str. 9
80801 München

Klinikadresse
Klinik MedNord
Heidemannstr. 5b
80939 München

