



**INSTITUT
FÜR PLASTISCHE
& ÄSTHETISCHE
CHIRURGIE**

Dr. Christian Lenz
Facharzt für plastische
und ästhetische Chirurgie
Tel. +49 89 80038228
info@medicalinstitut.de
www.medical-institut.de

Praxisadresse
Dr. Christian Lenz
Franz-Joseph-Str. 9
80801 München

Klinikadresse
Klinik MedNord
Heidemannstr. 5b
80939 München

Schamlippen-Korrektur

Allgemeines

Durch genetische Veranlagung oder starkes Übergewicht kann es zu einer Vergrößerung der inneren und äußeren Schamlippen kommen. Dies kann sowohl optisch als auch mechanisch störend sein.

Ablauf der Behandlung

Zunächst werden die Schamlippen exakt ausgemessen und der zu entfernende Bereich gekennzeichnet. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass größtmögliche Symmetrie vorliegt. Bei dem Eingriff wird die überschüssige Haut bzw. das Gewebe der vergrößerten inneren Schamlippen entfernt. Die Schamlippen werden dadurch auf ein natürlich wirkendes Maß korrigiert. Die Schnitte werden abschließend mit einem speziellen, sich selbst auflösenden Nahtmaterial versorgt.

OP-Dauer: 1 Stunde

Narkose: Vollnarkose

Nachbehandlung

Um die Heilung zu unterstützen und eventuellen Komplikationen vorzubeugen, werden die Wunden durch eine sterile Abdeckung bzw. durch einen Sprayverband geschützt. Sitzbäder halten die Region sauber. Der Urin hat, da er steril ist, keine negative Auswirkung. Der Heilungsverlauf entspricht dem eines Dammschnittes nach einer Geburt (ca. 5 – 7 Tage Heilungszeit).

Geschäftsfähigkeit: Nach 3 Tagen

Gesellschaftsfähigkeit: Nach 3 Tagen, sexuelle Aktivitäten nach 3 Wochen

Sport: Nach 3 Wochen

Sonne und Solarium: Nach 3 Wochen

Sauna: Nach 3 Wochen

Nachuntersuchungen: Nach 2, 8 und 16 Wochen

Mögliche Risiken

Nach dem Eingriff kann es, wie nach jeder Operation, zu einer Gewebeschwellung kommen, die im Normalfall nach einigen Tagen abklingt. Äußerst selten kann es auch zu Nachblutungen kommen. Mit einer Einschränkung der Sensibilität ist nicht zu rechnen.